

Malattia di Crohn: terapia precoce con infliximab

» Le terapie biologiche, se usate nella fase precoce nella malattia di Crohn, potrebbero produrre risultati molto positivi e superiori rispetto agli approcci tradizionali. I risultati dello studio SONIC (Study of Biologic ad Immunomodulator Naive Patients in Crohn's Disease) hanno dimostrato che l'introduzione precoce di infliximab - farmaco biologico antagonista del TNF-alfa - in associazione con azatioprina o in monoterapia, in soggetti con malattia da moderata a grave (mai trattati con immunomodulatori o biologici) conduce un maggior numero di pazienti alla remissione di malattia, senza steroidi, rispetto alla terapia convenzionale (*NEJM* 2010; 362: 1383-95). In particolare il 57% dei pazienti trattati con infliximab in associazione ad azatioprina e il 44% dei trattati con infliximab in monoterapia hanno raggiunto la remissione della malattia senza steroidi vs 30% dei trattati con l'immunomodulatore.

Conferme per la cifoplastica con palloncino

» La validità della cifoplastica con palloncino per trattare le fratture vertebrali traumatiche è stata confermata da uno studio condotto dall'équipe del Prof. Antonio Franco, responsabile UO di Neurochirurgia dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Nei 54 pazienti sottoposti al trattamento, il primo dato riscontrato è stato il veloce recupero della mobilità (non oltre il 2° giorno postoperatorio). La riduzione del dolore è stato il secondo importante risultato; inoltre, la presenza del "palloncino" che risolve le vertebre, creando una cavità per l'inserimento del cemento osseo, ha il merito di ridurre il rischio di fuoriuscite di questo materiale negli adiacenti corpi vertebrali, evento che, al contrario, è molto più frequente in altre procedure.

Protezione per afte e lesioni buccali

» La nota linea Alovex, indicata per afte e lesioni buccali, si è rinnovata cambiando nome - ora si chiama "Alovex Protezione Attiva" - e grafica. Alovex Protezione Attiva forma una pellicola protettiva che, con un'azione meccanica, isola la lesione dal contatto con gli agenti esterni riducendo dolore e fastidio causato da afte, stomatiti aftose, afte diffuse e piccole lesioni della bocca dovute al contatto con apparecchi ortodontici, protesi fisse e mobili.

La presenza di acido ialuronico, aloe vera e glicirrizato di potassio favorisce la naturale cicatrizzazione delle lesioni; per offrire ancora più protezione e sempre meno dolore, tutte le confezioni contengono una maggior quantità di acido ialuronico rispetto alle precedenti.

Alovex Protezione Attiva è disponibile in 3 formulazioni:

- gel, da utilizzare in caso di lesioni (singole e multiple) poste in zone raggiungibili tramite il pratico applicatore, è la formulazione di primo impiego in pediatria;

- collutorio, indicato in caso di afte diffuse, stomatiti aftose, aftosi ricorrenti, lesioni di grandi dimensioni o poste nella parte posteriore della bocca;

- spray, che può essere utilizzato per lesioni singole o diffuse, anche posizionate in punti difficili della bocca. Lo spray è particolarmente adatto per l'utilizzo fuori casa poiché è dotato di un direttore che permette un'applicazione mirata, pratica, comoda e igienica.

Per tutte le formulazioni la posologia consigliata è di 3/4 applicazioni/die o più, secondo necessità e viene consigliato di non mangiare e bere per almeno un'ora dopo l'applicazione.

Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico che agisce localmente; non causa bruciori quando si applica, non contiene alcol ed è adatto per adulti e bambini.

Per richiedere l'invio di campioni e materiali informativi: dipub@recordati.it o fax: 02.48787299.

Rimborso completo per acarbose

» Disponibile da anni in Italia, acarbose, farmaco per il diabete di tipo 2, è stato promosso in fascia A. Acarbose è un inibitore dell'alfaglicosidasi intestinale, ha un valido profilo di sicurezza, poiché il suo meccanismo d'azione non provoca ipoglicemia, riduce l'insulinemia e può essere associato a qualunque farmaco ipoglicemizzante. Accanto all'efficacia clinica, ha un favorevole rapporto costo/efficacia: la terapia con il farmaco costa meno di 0.60 euro al giorno e permette di ridurre il rischio cardiovascolare di oltre il 30% (*Eur Heart J* 2004; 25: 10-6). Nel nostro Paese, nell'ultimo decennio i costi per il Servizio sanitario nazionale per la gestione dei malati diabetici sono più che raddoppiati: se nel 1998 il diabete pesava sulle casse del Ssn per circa 5 miliardi di euro, oggi si stimano almeno 11 miliardi.

Efficacia e sicurezza di bisacodile nella stipsi

» Confermata in un nuovo studio l'efficacia e la sicurezza del lassativo di contatto bisacodile (*Dulcolax*). Il trial, condotto da Boehringer Ingelheim, ha dimostrato l'efficacia della molecola nell'aumentare la frequenza delle evacuazioni e favorire la regolarità intestinale (*Digestive Disease Week* maggio 2010, New Orleans).

Obiettivo dello studio randomizzato in doppio cieco vs placebo, che ha coinvolto 368 soggetti con stitichezza cronica secondo i criteri "Rome III" era stabilire efficacia e sicurezza di bisacodile 10 mg 1 cpr/die. Nelle quattro settimane di trattamento, il numero medio di evacuazioni intestinali spontanee settimanali è stato significativamente superiore nel gruppo bisacodile rispetto al placebo ($p < 0.0001$). La molecola ha dimostrato anche di essere ben tollerata.