

## ■ CHIRURGIA

### Emorroidi: prolassectomia con nuova suturatrice meccanica

■ **Patrizia Lattuada**

**L**e tecniche chirurgiche per la terapia delle emorroidi (Ferguson e Milligan-Morgan) hanno tempi di degenza di 2-4 giorni, un decorso doloroso e prolungato e un rischio di recidive del 2% che nella prolassectomia con Stapler, nota come tecnica di Longo, si attesta all'8-9%. Di recente l'approccio chirurgico è stato perfezionato grazie all'ideazione della "sutartrice meccanica circolare ad alto volume", che rappresenta un progresso tecnologico nel trattamento delle emorroidi. "L'introduzio-

ne nella pratica clinica della nuova suturatrice consente al chirurgo da un lato la rimozione di una maggior quantità di tessuto prolassato, con la conseguente diminuzione del rischio di recidive, dall'altro un sistema di sutura più efficace e meno emorragica, con riduzione delle complicanze postoperatorie", commenta **Giuliano Reboa**, colonproctologo presso la Casa di Cura San Camillo di Forte dei Marmi e inventore della nuova tecnologia. Pur non modificando le procedure chirurgiche standardizzate, con il

nuovo dispositivo è possibile ottenere risultati più efficaci. Il maggior volume di tessuto asportato consente, infatti, di trattare in modo più completo tutti i gradi di malattia senza pericolo di lasciare residui. I pazienti eligibili per il nuovo approccio sono quelli con emorroidi di II grado avanzato, III e IV grado e con prolassi retтали. La nuova opzione tecnologica è riconosciuta dal Ssn all'interno di strutture ospedaliere specializzate. Si stima che da gennaio in Italia sono stati compiuti già 700 interventi e nel mondo ne sono già eseguiti oltre 5.000.

[www.qr-link.it/video/0612](http://www.qr-link.it/video/0612)



Puoi visualizzare il video di approfondimento anche con smartphone/iphone attraverso il presente QR-Code

#### Confronto fra le tecniche chirurgiche

|                            | <b>Tecnica Ferguson</b>   | <b>Tecnica Milligan e Morgan</b>  | <b>Prolassectomia con suturatrice meccanica</b>   | <b>Prolassectomia con nuova suturatrice</b>  |
|----------------------------|---|---|---|--|
| <b>Vantaggi/ Svantaggi</b> | Minore rischio di recidive.<br><br>Il dolore è molto intenso nei primi tempi dopo l'intervento. | Minore rischio di recidive.<br><br>Il dolore è molto intenso nei primi tempi dopo l'intervento. | Asportazione di un anello di prolasso mucoso al di sopra dei cuscinetti emorroidari e loro riposizionamento nella sede naturale.<br>La conservazione dei cuscinetti è importante per la continenza anale.<br>Dolore limitato. | Asportazione di un anello di prolasso mucoso al di sopra dei cuscinetti emorroidari e loro riposizionamento nella sede naturale.<br>La conservazione dei cuscinetti è importante per la continenza anale.<br>Dolore limitato e minore sanguinamento postoperatorio, minor rischio di recidive. |